# Что нужно знать о COVID-19?

## «Омикрон» - один из последних штаммов коронавируса [1-4]

## “Стелс-Омикрон" – доминирующий и самый передаваемый вариант Омикрона[2]

**Более устойчив** к антителам и существующим вакцинам

**Симптомы** схожи с ОРВИ

**Более заразный,** чем его предшественники

**ПЦР-тест** в начале заболевания чаще всего отрицательный

**Передается в 7 раз быстрее,** чем другие возбудители COVID-19

**Инкубационный период** 2-5 дней

## Симптомы

**Головная боль**

**Слабость, снижение аппетита**

**Кашель, першение в горле**

**Ломота в мышцах и суставах**

**Заложенность носа, насморк, чихание**

**Повышение температуры до 38°С, иногда и выше**


1. http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/633/omikron-cto-novogo, дата обращения 29.04.2022 г.
2. https://www.unicef.org/coronavirus/what-we-know-about-omicron-variant#stealth, дата обращения 29.04.2022 г.
3. https://www.interfax.ru/russia/807076, дата обращения 29.04.2022 г.
4. https://www.kommersant.ru/doc/5170295, дата обращения 29.04.2022 г.


ПЕРЕДАЙТЕ ПАЦИЕНТУ

# Рациональная терапия

## АРЕПЛИВИР

Исследования эффективности и безопасности препарата Арепливир (фавипиравир) показали[1]:

**У 80% пациентов в первые дни**
происходит перелом в течении болезни и снижается риск развития осложнений

**> чем у 60% пациентов уже на 3-й день**
отсутствует лихорадка и уменьшаются симптомы общей интоксикации, улучшается самочувствие

**У 78% пациентов на 5-й день**
нормализация уровня кислорода и исчезновение признаков воспаления

**Благоприятный профиль безопасности**

**АРЕПЛИВИР** (фавипиравир) и **ЭСПЕРАВИР** (молнупиравир) обладают универсальным механизмом действия – подавляют РНК-вирусы (такие как грипп и другие ОРВИ), включая Омикрон

Указаны во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 МЗ РФ (2022)[2]

## ЭСПЕРАВИР

Исследование по оценке основных параметров, безопасности, эффективности в отношении COVID-19 у взрослых[3]

**Быстро**
После 5 дней терапии: у 9 из 10 пациентов – полное выведение вируса, каждый 2 пациент полностью выздоровел*

**Надежно**
Степень тяжести заболевания не ухудшилась. Благоприятный профиль безопасности

**Эффективно**
Снижает вероятность госпитализации и ухудшения состояния даже у пациентов с факторами риска**




*0 баллов по категориальной порядковой шкале клинического статуса ВОЗ; **по сравнению с пациентами, принимавшими умифеновир

1. Балыкова Л.А., Грановская М.В., Заславская К.Я., Симакина Е.Н., Агафьина А.С., Иванова А.Ю., Колонтарев К.Б., Пушкарь Д.Ю. Новые возможности направленной противовирусной терапии COVID-19: результаты многоцентрового клинического исследования эффективности и безопасности применения препарата Арепливир. Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2020. Т. 9, № 3. С. 16–29. DOI: https://doi.org/10.33029/2305-3496-2020-9-3-16-29
2. Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции (COVID-19), версия 15 (22.02.2022).
3. Данные, предоставленные компанией Промомед на основе результатов Открытого двухэтапного многоцентрового исследования по оценке основных фармакокинетических параметров, безопасности, а также эффективности в отношении COVID-19 лекарственного препарата JCBC00101, капсулы (ООО «ПРОМОМЕД РУС», Россия) у взрослой популяции

VIROnews

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ